

# ANNALES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE TOULOUSE Mathématiques

XAVIER BUFF

*Courants dynamiques pluripolaires*

Tome XX, n° 1 (2011), p. 203-214.

[http://afst.cedram.org/item?id=AFST\\_2011\\_6\\_20\\_1\\_203\\_0](http://afst.cedram.org/item?id=AFST_2011_6_20_1_203_0)

© Université Paul Sabatier, Toulouse, 2011, tous droits réservés.

L'accès aux articles de la revue « Annales de la faculté des sciences de Toulouse Mathématiques » (<http://afst.cedram.org/>), implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://afst.cedram.org/legal/>). Toute reproduction en tout ou partie cet article sous quelque forme que ce soit pour tout usage autre que l'utilisation à fin strictement personnelle du copiste est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

cedram

Article mis en ligne dans le cadre du  
Centre de diffusion des revues académiques de mathématiques  
<http://www.cedram.org/>

## Courants dynamiques pluripolaires

XAVIER BUFF<sup>(1)</sup>

**RÉSUMÉ.** — On montre l'existence d'applications rationnelles  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  telles que

- $f$  est algébriquement stable : pour tout  $n \geq 0$ ,  $\deg f^{\circ n} = (\deg f)^n$ ,
- il existe un unique courant positif fermé  $T$  de bidegré  $(1, 1)$  vérifiant  $f^*T = d \cdot T$  et  $\int_{\mathbb{P}^k} T \wedge \omega^{k-1} = 1$  où  $\omega$  est la forme de Fubini-Study sur  $\mathbb{P}^k$  et
- $T$  est pluripolaire : il existe un ensemble pluripolaire  $X \subset \mathbb{P}^k$  tel que  $\int_X T \wedge \omega^{k-1} = 1$

**ABSTRACT.** — We prove the existence of rational maps  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  such that

- $f$  is algebraically stable: for all  $n \geq 0$ ,  $\deg f^{\circ n} = (\deg f)^n$ ,
- there is a unique closed positive  $(1, 1)$  current  $T$  satisfying  $f^*T = d \cdot T$  and  $\int_{\mathbb{P}^k} T \wedge \omega^{k-1} = 1$  where  $\omega$  is the Fubini-Study form on  $\mathbb{P}^k$  and
- $T$  is a pluripolar current: there is a pluripolar set  $X \subset \mathbb{P}^k$  such that  $\int_X T \wedge \omega^{k-1} = 1$ .

On se donne un entier  $k \geq 2$ . On note  $\pi : \mathbb{C}^{k+1} - \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^k$  la projection canonique. Soit  $\omega$  la forme de Fubini-Study sur  $\mathbb{P}^k$  définie par  $\pi^*\omega = dd^c \log \|\cdot\|$ .

Rappelons qu'une fonction  $u : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow [-\infty, +\infty)$ , non identiquement  $-\infty$ , est psh (plurisousharmonique) si  $u$  est semi-continue supérieurement

(\*) Reçu le 22/04/2010, accepté le 09/09/2010  
Ce travail a été partiellement soutenu par le projet ANR-08-JCJC-002 et par l'IUF.

<sup>(1)</sup> Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, France  
xavier.buff@math.univ-toulouse.fr

et si la restriction de  $u$  à toute droite complexe est soit sousharmonique, soit identiquement  $-\infty$ . Alors,  $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{C}^{k+1})$  et le courant  $\text{dd}^c u$  est positif.

Nous dirons qu'une fonction  $g : \mathbb{P}^k \rightarrow [-\infty, +\infty)$  est  $\omega$ -psh lorsque la fonction  $u : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow [-\infty, +\infty)$  définie par  $u(0) = -\infty$  et  $u(z) = \log \|z\| + g \circ \pi(z)$  si  $z \neq 0$  est une fonction psh sur  $\mathbb{C}^{k+1}$ . En particulier,

- $g$  est semi-continue supérieurement,
- $g$  n'est pas identiquement  $-\infty$ ,
- $g \in L^1(\mathbb{P}^k)$ ,
- $\omega + \text{dd}^c g$  est un courant positif et
- $\text{dd}^c u = \pi^*(\omega + \text{dd}^c g)$ .

On note  $\mathcal{T}$  l'ensemble des courants positifs fermés et de bidegré  $(1, 1)$  sur  $\mathbb{P}^k$ , équipé de la topologie faible. Si  $T \in \mathcal{T}$ , la distribution  $T \wedge \omega^{k-1}$  s'identifie, via le théorème de représentation de Riesz, avec une mesure borélienne sur  $\mathbb{P}^k$ . La masse de  $T$  est

$$\|T\| = \int_{\mathbb{P}^k} T \wedge \omega^{k-1}.$$

Plus généralement, si  $X \subseteq \mathbb{P}^k$  est un ensemble mesurable, on note

$$\|T\|_X = \int_X T \wedge \omega^{k-1}.$$

L'ensemble des courants  $T \in \mathcal{T}$  de masse  $\|T\| = 1$  est compact. Lorsque  $\|T\| = 1$ , il existe une fonction  $\omega$ -psh  $g : \mathbb{P}^k \rightarrow [-\infty, +\infty)$  telle que  $\omega + \text{dd}^c g = T$ . On dit que  $g$  est un potentiel associé à  $T$ . Notons que si  $g_1$  et  $g_2$  sont deux potentiels associés au même courant  $T$ , alors  $g_1 - g_2$  est une fonction pluriharmonique sur  $\mathbb{P}^k$ , donc constante.

Soit  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  une application rationnelle de degré algébrique  $d \geq 2$  et soit  $F : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1}$  une application vérifiant  $f \circ \pi = \pi \circ F$  et dont les coordonnées sont des polynômes homogènes de degré  $d$ . Dans tout l'article, les applications rationnelles  $f$  considérées seront supposées *dominantes*, c'est-à-dire que le Jacobien de  $F$  est non identiquement nul. L'application  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  induit alors une application continue  $f^* : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$  et l'on a  $\|f^* T\| = d \cdot \|T\|$ . Il est facile de voir qu'il existe un courant  $T \in \mathcal{T}$  tel que

$$f^* T = d \cdot T \quad \text{et} \quad \|T\| = 1.$$

On peut par exemple considérer la suite de courants  $(T_N)$  définis par

$$S_0 = \omega, \quad S_{n+1} = \frac{1}{d} f^* S_n \quad \text{et} \quad T_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n.$$

Par récurrence sur  $n \geq 0$ , on a  $\|S_n\| = 1$  et donc  $\|T_N\| = 1$  pour tout  $N \geq 1$ . Par passage à la limite sur

$$\frac{1}{d} f^{*N} T_N = T_N + \frac{1}{N} (S_N - S_0),$$

on obtient que toute valeur d'adhérence  $T$  de la suite  $T_N$  satisfait

$$f^* T = d \cdot T \quad \text{et} \quad \|T\| = 1.$$

Dans le cas général, un tel courant  $T$  n'est pas unique.

Rappelons qu'un ensemble  $X \subset \mathbb{P}^k$  est *pluripolaire complet* s'il existe une fonction  $\omega$ -psh  $g$  sur  $\mathbb{P}^k$  telle que  $X = \{g = -\infty\}$ . Nous dirons qu'un courant  $T \in \mathcal{T}$  est *pluripolaire* s'il existe un ensemble pluripolaire complet  $X \subset \mathbb{P}^k$  tel que  $\|T\|_X = \|T\|$  (toute la masse de  $T$  se concentre sur un ensemble pluripolaire).

Une application rationnelle  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  est *algébriquement stable* si le degré algébrique de  $f$  et le degré algébrique de  $f^{\circ n}$  sont reliés par  $\deg f^{\circ n} = (\deg f)^n$  pour tout  $n \geq 0$ . Notre but est de montrer l'existence d'applications rationnelles algébriquement stables  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  pour lesquelles il existe un unique courant  $T \in \mathcal{T}$  vérifiant  $f^* T = d \cdot T$  et  $\|T\| = 1$ , et pour lesquelles ce courant  $T$  est pluripolaire.

**THÉORÈME 0.1.** — *Soient  $(f_t : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k)_{t \in [0,1]}$  une famille d'applications rationnelles de degré  $d$  et  $\mathcal{Z} \subset [0,1]$  un ensemble dénombrable dense tels que*

- *il existe une famille  $(F_t : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1})_{t \in [0,1]}$  homogènes de degré  $d$  vérifiant  $f_t \circ \pi = \pi \circ F_t$  et dépendant continuellement de  $t \in [0,1]$  pour la topologie de la convergence localement uniforme,*
- *l'application  $F_t$  fixe un point  $z_t \in \mathbb{C}^{k+1} - \{0\}$  qui dépend continuellement de  $t$  et*
- *l'application  $f_t$  est algébriquement stable si et seulement si  $t \in [0,1] - \mathcal{Z}$ .*

*Alors, il existe un ensemble  $A \subset [0,1] - \mathcal{Z}$  gras au sens de Baire tel que pour tout  $t \in A$ ,*

- *il existe un unique courant  $T \in \mathcal{T}$ , vérifiant  $f_t^* T = d \cdot T$  et  $\|T\| = 1$  et*
- *$T$  est pluripolaire.*

Un exemple d'une telle famille d'applications rationnelles  $(f_t : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k)_{t \in [0,1]}$  avec  $k = 2$  et  $d = 2$  est donné par Charles Favre [F]. Dans son

exemple, les applications  $f_t$  sont birationnelles. En appliquant le théorème à  $(f_t)$  et  $(f_t^{-1})$  on montre que l'ensemble des  $t \in [0, 1] - \mathcal{Z}$  pour lesquels les courants de Green  $T_{f_t}^+$  et  $T_{f_t}^-$  sont pluripolaires est gras au sens de Baire.

La variante suivante est due à Jeffrey Diller et Vincent Guedj [DG]. Considérons la famille d'applications birationnelles  $f_t : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$  définies par

$$F_t(x, y, z) = (bcx(-cx + acy + z), acy(x - ay + abz), abz(bcx + y - bz))$$

avec

$$a = i, \quad b = -2e^{i\pi/4}e^{i\pi t} \quad \text{et} \quad c = \frac{1}{2}e^{i\pi/4}e^{i\pi t}.$$

L'inverse de  $f_t$  est une application de la même forme où  $a, b, c$ , sont remplacés par  $a^{-1}, b^{-1}$  et  $c^{-1}$ . Les points d'indétermination de  $f_t$  sont  $[a : 1 : 0]$ ,  $[0 : b : 1]$  et  $[1 : 0 : c]$  et ceux de  $f_t^{-1}$  sont  $[a^{-1} : 1 : 0]$ ,  $[0 : b^{-1} : 1]$  et  $[1 : 0 : c^{-1}]$ . Les applications  $f_t$  et  $f_t^{-1}$  fixent globalement chacune des droites  $\{x = 0\}$ ,  $\{y = 0\}$  et  $\{z = 0\}$ .

Dans la droite  $\{x = 0\}$ , le point d'indétermination de  $f_t$  est  $[0 : b : 1]$  et le point d'indétermination de  $f_t^{-1}$  est  $[0 : 1/b : 1]$ . La restriction de  $f_t$  à cette droite est  $[0 : y : 1] \mapsto [0 : iy/4 : 1]$ . Étant donné que  $|1/b| < |b|$ , l'orbite de  $[0 : 1/b : 1]$  sous itération de  $f_t$  ne rencontre jamais  $[0 : b : 1]$  et l'orbite de  $[0 : b : 1]$  sous itération de  $f_t^{-1}$  ne rencontre jamais  $[0 : 1/b : 1]$ .

Dans la droite  $\{y = 0\}$ , le point d'indétermination de  $f_t$  est  $[1 : 0 : c]$  et le point d'indétermination de  $f_t^{-1}$  est  $[1 : 0 : 1/c]$ . La restriction de  $f_t$  à cette droite est  $[1 : 0 : z] \mapsto [1 : 0 : -4iz]$ . Étant donné que  $|1/c| > |c|$ , l'orbite de  $[1 : 0 : 1/c]$  sous itération de  $f_t$  ne rencontre jamais  $[1 : 0 : c]$  et l'orbite de  $[1 : 0 : c]$  sous itération de  $f_t^{-1}$  ne rencontre jamais  $[1 : 0 : 1/c]$ .

Dans la droite  $\{z = 0\}$ , le point d'indétermination de  $f_t$  est  $[i : 1 : 0]$  et le point d'indétermination de  $f_t^{-1}$  est  $[-i : 1 : 0]$ . La restriction de  $f_t$  à cette droite est  $[x : 1 : 0] \mapsto [e^{i2\pi t}x : 1 : 0]$ , c'est-à-dire une rotation d'angle  $t$  tours. Les points  $[i : 1 : 0]$  et  $[-i : 1 : 0]$  sont deux points opposés d'un cercle invariant par  $f_t$ .

- Si  $t$  est irrationnel, l'orbite de  $[-i : 1 : 0]$  sous itération de  $f_t$  ne rencontre donc pas le point  $[i : 1 : 0]$  et l'orbite de  $[i : 1 : 0]$  sous itération de  $f_t^{-1}$  ne rencontre pas  $[-i : 1 : 0]$ . Dans ce cas les applications  $f_t$  et  $f_t^{-1}$  sont algébriquement stables.
- En revanche, si  $t = (2p + 1)/(2q)$  est rationnel à dénominateur pair, alors le  $q$ -ième itéré de  $f_t$  est la rotation d'angle  $1/2$  tour qui envoie  $[-i : 1 : 0]$  sur  $[i : 1 : 0]$ . De même le  $q$ -ième itéré de  $f_t^{-1}$  est la

rotation d'angle  $1/2$  tour qui envoie  $[i : 1 : 0]$  sur  $[-i : 1 : 0]$ . Les applications  $f_t$  et  $f_t^{-1}$  ne sont pas algébriquement stables.

Enfin,  $F_t(0, 0, z) = (0, 0, -ab^2z^2)$  et donc, l'application  $F_t$  fixe le point

$$z_t = \left(0, 0, -\frac{1}{ab^2}\right) = (0, 0, e^{i2\pi t}/4) \in \mathbb{C}^3 - \{0\}$$

qui dépend continuellement de  $t$ .

Jeffrey Diller et Vincent Guedj [DG] montrent que dans le cas de leur exemple, lorsque  $f$  est algébriquement stable, il est toujours possible de définir une mesure produit

$$\mu_f = T_f^+ \wedge T_f^-.$$

D'après Jeffrey Diller, Romain Dujardin et Vincent Guedj [DDG], lorsque les courants  $T_f^+$  et  $T_f^-$  sont pluripolaires, l'application  $f$  n'est pas d'énergie finie et la mesure  $\mu_f$  charge totalement un ensemble pluripolaire. Notre résultat répond donc à une question posée dans [DDG] concernant l'existence d'applications rationnelles de petit degré topologique et d'énergie infinie. Bien que dans ce cas, les techniques exposées dans [DDG] ne s'appliquent pas, il reste néanmoins intéressant d'étudier les propriétés dynamiques de la mesure  $\mu_f$ .

## 1. Courants de Green dynamiques

La construction suivante est due à Nessim Sibony [S]. Soit  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  une application rationnelle de degré  $d \geq 2$  et soit  $F : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1}$  une application polynômiale homogène de degré  $d$  relevant  $f$ , c'est-à-dire telle que  $f \circ \pi = \pi \circ F$ . Sans perte de généralité, quitte à multiplier  $F$  par une constante  $C$ , on peut supposer que  $\|F(z)\| \leq \|z\|^d$ .

On définit la fonction  $\omega$ -psh  $g^{(0)}$  par

$$g^{(0)}(\pi(z)) = \frac{1}{d} \log \|F(z)\| - \log \|z\|.$$

On vérifie facilement que si la fonction  $\omega$ -psh  $h$  est un potentiel pour un courant  $T \in \mathcal{T}$  de masse 1, alors  $g^{(0)} + d^{-1} \cdot h \circ f$  est un potentiel pour  $d^{-1}f^*T$ . Trouver un courant  $T \in \mathcal{T}$  tel que  $f^*T = d \cdot T$  et  $\|T\| = 1$  revient donc à trouver une fonction  $\omega$ -psh  $h$  telle que  $g^{(0)} + d^{-1} \cdot h \circ f = h + c$  avec  $c \in \mathbb{R}$ . Quitte à remplacer  $h$  par  $h - dc/(d-1)$ , cela se ramène à déterminer les solutions  $\omega$ -psh  $h$  de l'équation

$$h - \frac{1}{d}h \circ f = g^{(0)}. \tag{1.1}$$

Nous avons vu qu'il existe toujours un courant  $T \in \mathcal{T}$  tel que  $f^*T = d \cdot T$  et  $\|T\| = 1$ , donc une solution  $\omega$ -psh  $h$  de l'équation (1.1) avec  $T = \omega + \text{dd}^c h$ . On peut également produire une solution de la manière suivante. On considère la suite de fonctions  $\omega$ -psh  $(g^{(n)})_{n \geq 0}$  définie récursivement pour  $n \geq 1$  par

$$g^{(n)} = g^{(0)} + \frac{1}{d} g^{(n-1)} \circ f$$

de sorte que  $T^{(n)} = \omega + \text{dd}^c g^{(n)}$  satisfasse

$$T^{(0)} = \omega \quad \text{et} \quad T^{(n)} = \frac{1}{d} f^* T^{(n-1)}.$$

Alors,

$$g^{(n)} = \sum_{m=0}^{n-1} \frac{1}{d^m} g^{(0)} \circ f^{\circ m} = h - \frac{1}{d^{n+1}} h \circ f^{\circ n+1}.$$

Étant donné que  $g^{(0)}$  est négative, la suite  $(g^{(n)})_{n \geq 0}$  est décroissante. La fonction  $h$  est majorée sur  $\mathbb{P}^k$ . La suite  $(g^{(n)})_{n \geq 0}$  est donc minorée par  $h$ . Elle converge simplement et dans  $L^1(\mathbb{P}^k)$  vers une fonction  $\omega$ -psh  $g$ . Étant donné que

$$g^{(n)} - \frac{1}{d} g^{(n-1)} \circ f = g^{(0)},$$

cette limite  $g$  est solution de l'équation (1.1). On note  $T_f$  le courant de Green dynamique défini par

$$T_f = \omega + \text{dd}^c g.$$

D'après ce que nous venons de voir, toute solution  $h$  de l'équation (1.1) vérifie  $h \leq g + c$  avec  $c \in \mathbb{R}$ .

Notons de plus que si l'on fait l'hypothèse que  $F$  fixe un point  $z_0 \in \mathbb{C}^{k+1} - \{0\}$  (c'est le cas dans le cadre du théorème) et si l'on note  $x_0 = \pi(z_0)$ , alors

$$g^{(0)}(x_0) = \frac{1}{d} \log \|z_0\| - \log \|z_0\|$$

et on a le contrôle uniforme suivant :

$$g(x_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{d^n} g^{(0)} \circ f^{\circ n}(x_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{d^n} g^{(0)}(x_0) = \frac{d}{d-1} g^{(0)}(x_0) = -\log \|z_0\|.$$

## 2. Le cas non algébriquement stable

Dans cette partie, on suppose que  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  est une application rationnelle de degré  $d$  qui n'est pas algébriquement stable. On suppose que  $F : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1}$  est une application dont les coordonnées sont des polynômes homogènes de degré  $d$  telle que  $f \circ \pi = \pi \circ F$  et  $\|F(z)\| \leq \|z\|^d$ . Comme dans la partie précédente, on définit une suite décroissante de fonctions  $\omega$ -psh  $(g^{(n)})_{n \geq 0}$  qui convergent simplement et dans  $L^1(\mathbb{P}^k)$  vers une fonction  $\omega$ -psh  $g$  et on pose  $T_f = \omega + \text{dd}^c g$ .

PROPOSITION 2.1 (SIBONY [S]). — *Si  $f$  est algébriquement instable, le courant de Green dynamique  $T_f$  est porté par une réunion dénombrable d'ensembles algébriques. En particulier, il est pluripolaire.*

*Preuve.* — Étant donné que  $f$  n'est pas algébriquement stable, si  $n$  est suffisamment grand,  $\deg(f^{\circ n}) < d^n$ . Cela signifie que les coordonnées de  $F^{\circ n}$  ont un facteur commun. On note  $H^{(n)}$  le plus grand diviseur commun des coordonnées de  $F^{\circ n}$  de sorte que

$$F^{\circ n} = H^{(n)} \cdot \check{F}^{(n)} \quad \text{avec} \quad \deg f^{\circ n} = \deg \check{F}^{(n)}.$$

Alors,

$$g^{(n)}(\pi(z)) = \frac{1}{d^n} \log \|H^{(n)}(z)\| + \frac{1}{d^n} \log \|\check{F}^{(n)}(z)\| - \log \|z\|.$$

En particulier, le courant  $\omega + \text{dd}^c g^{(n)}$  charge l'ensemble algébrique  $X_n$  défini par l'équation  $H_n = 0$  avec

$$\|\omega + \text{dd}^c g^{(n)}\|_{X_n} = \frac{1}{d^n} \deg(H^{(n)}) = 1 - \frac{\deg(f^{\circ n})}{d^n}.$$

De plus, pour  $m \geq 0$ ,

$$F^{\circ n+m} = (H^{(n)})^{d^m} \cdot F^{\circ m} \circ \check{F}^{(n)},$$

ce qui montre que  $(H^{(n)})^{d^m}$  divise  $H^{(n+m)}$ . On en déduit que pour tout  $m \geq 0$ , le courant  $\omega + \text{dd}^c g^{(n+m)}$  charge l'ensemble algébrique  $X_n$  avec

$$\|\omega + \text{dd}^c g^{(n+m)}\|_{X_n} \geq 1 - \frac{\deg(f^{\circ n})}{d^n}.$$

Quand  $m \rightarrow +\infty$ , la suite de courants  $\omega + \text{dd}^c g^{(n+m)}$  converge faiblement vers le courant  $T_f = \omega + \text{dd}^c g$ . On en déduit que

$$\|T_f\|_{X_n} \geq 1 - \frac{\deg(f^{\circ n})}{d^n}.$$

Si  $x \in X_n$ , alors  $g(x) \leq g^{(n)}(x) = -\infty$ . Donc la réunion  $X = \bigcup X_n$  est contenue dans  $\{g = -\infty\}$  et

$$1 \geq \|T_f\|_{\{g=-\infty\}} \geq \|T_f\|_X \geq \|T_f\|_{X_n} = 1 - \frac{\deg(f^{\circ n})}{d^n}.$$

Étant donné que  $\deg(f^{\circ n})/d^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ , on a finalement

$$\|T_f\|_{\{g=-\infty\}} = \|T_f\|_X = 1.$$

□

### 3. Unicité du courant invariant

PROPOSITION 3.1. — *Soit  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  une application rationnelle de degré algébrique  $d$  dont le courant de Green dynamique  $T_f$  vérifie  $\|T_f\|_{\{g=-\infty\}} = 1$  avec  $g$  un potentiel de  $T_f$ . Si  $T \in \mathcal{T}$  est un courant vérifiant  $f^*T = d \cdot T$  et  $\|T\| = 1$  alors  $T = T_f$ .*

*Preuve.* — Comme nous l'avons rappelé plus haut,  $T_f = \omega + dd^c g$  et  $T = \omega + dd^c h$  pour des fonctions  $\omega$ -psh  $h$  et  $g$  qui vérifient  $h \leq g$ . Par hypothèse  $\|\omega + dd^c g\|_{\{g=-\infty\}} = 1$ . Le lemme 3.2 ci-dessous implique que  $h - g$  est constante et donc que  $T = T_f$ . □

LEMME 3.2. — *Soit  $h$  et  $g$  deux fonctions  $\omega$ -psh sur  $\mathbb{P}^k$  telles que*

$$h \leq g \quad \text{et} \quad \|\omega + dd^c g\|_{\{g=-\infty\}} = 1.$$

*Alors  $h = g + c$  avec  $c \in \mathbb{R}$ .*

*Preuve.* — Si  $\{g = -\infty\}$  est fermé, la démonstration est immédiate. En effet, en dehors de cet ensemble, la fonction  $g$  est lisse et la fonction  $h - g$  est psh négative. Elle se prolonge donc en une fonction globalement plurisousharmonique sur  $\mathbb{P}^k$ , donc constante.

La difficulté apparaît lorsque l'on ne fait pas l'hypothèse que  $\{g = -\infty\}$  est fermé. Si l'on travaille localement dans une carte complexe, on peut se donner une fonction lisse  $\phi$  telle que  $dd^c \phi = \omega$ . Les fonctions

$$u = \phi + g \quad \text{et} \quad v = \phi + h$$

sont alors plurisousharmoniques, en particulier sousharmoniques. Si l'on identifie  $\mathbb{C}^n$  à  $\mathbb{R}^{2n}$ , les Laplaciens au sens des distributions de  $u$  et  $v$  sont des mesures de Riesz  $\Delta u$  et  $\Delta v$ . Le lieu  $\{u \neq -\infty\}$  n'est pas chargé par le courant  $dd^c u = \omega + dd^c g$ . Il n'est donc pas chargé par la mesure trace

de  $dd^c u$  qui, à une constante multiplicative près, est égale à  $\Delta u$ . De plus,  $v \leq u$ . D'après le lemme 3.3 ci-dessous, on a donc

$$\Delta v \geq \Delta u.$$

Dans la carte complexe considérée, la fonction  $h-g = v-u$  est donc sousharmonique. Comme cela est vrai localement dans n'importe quelle carte complexe, la fonction  $h-g$  est globalement plurisousharmonique sur  $\mathbb{P}^k$ , donc constante.  $\square$

LEMME 3.3. — Soient  $m \geq 2$  et soit  $B$  la boule unité de  $\mathbb{R}^m$ . Soient  $u : B \rightarrow [-\infty, +\infty)$  et  $v : B \rightarrow [-\infty, +\infty)$  deux fonctions sousharmoniques et  $\Delta u$  et  $\Delta v$  les mesures de Riesz sur  $B$  associées à  $u$  et  $v$ . On suppose que

$$v \leq u \quad \text{et} \quad \Delta u(\{u \neq -\infty\}) = 0.$$

Alors  $\Delta v \geq \Delta u$ .

*Preuve.* — Soit  $X \subset B$  un borélien. On doit montrer que  $\Delta v(X) \geq \Delta u(X)$ . Or, par hypothèse,  $\Delta u(X) = \Delta u(Y)$  où  $Y = X \cap \{u = -\infty\}$ . Par propriété de régularité intérieure des mesures boréliennes, on peut trouver une suite de fermés  $Y_j \subseteq Y$  tels que  $\Delta u(Y_j) \rightarrow \Delta u(Y)$  quand  $j \rightarrow +\infty$ . On note  $\mu_j = \mathbf{1}_{Y_j} \cdot \Delta u$  et on choisit pour chaque  $j$  un potentiel  $u_j : B \rightarrow [-\infty, +\infty)$  tel que  $\Delta u_j = \mu_j$ .<sup>1</sup> Étant donné que  $\Delta u \geq \Delta u_j$ , la fonction  $u-u_j$  est sousharmonique sur  $B$ . En particulier, elle est localement majorée. La fonction  $u_j$  est harmonique en dehors de  $Y_j$ . Par conséquent, la fonction  $v-u_j$  est sousharmonique sur  $B-Y_j$  et localement majorée dans  $B$  (par  $u-u_j$ ). Comme  $Y_j \subseteq X$  est polaire, il existe une fonction sousharmonique  $v_j : B \rightarrow [-\infty, +\infty)$  qui prolonge  $v-u_j$ , c'est-à-dire telle que  $v = u_j + v_j$ . On a donc

$$\Delta v = \Delta u_j + \Delta v_j \geq \Delta u_j = \mu_j.$$

En particulier

$$\Delta v(X) \geq \Delta v(Y) \geq \mu_j(Y) = \Delta u(Y_j) \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} \Delta u(Y) = \Delta u(X).$$

$\square$

#### 4. Un lemme technique

Si  $X \subseteq \mathbb{P}^k$  est un ensemble mesurable et si  $g$  est une fonction  $\omega$ -psh, on note

$$I_X(g) = \int_X (\omega + dd^c g) \wedge \omega^{k-1}.$$

---

<sup>(1)</sup> C'est pour avoir l'existence d'un tel potentiel que l'on travaille dans le cadre des fonctions sousharmoniques et non celui des fonctions plurisousharmoniques.

Dans cette partie, on suppose que  $f : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k$  et  $(f_j : \mathbb{P}^k \rightarrow \mathbb{P}^k)_{j \geq 0}$  sont des applications rationnelles de degré  $d$  et que  $F : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1}$  et  $(F_j : \mathbb{C}^{k+1} \rightarrow \mathbb{C}^{k+1})$  sont des applications dont les coordonnées sont des polynômes homogènes de degré  $d$  telles que

- $f \circ \pi = \pi \circ F$  et  $f_j \circ \pi = \pi \circ F_j$ ,
- $\|F(z)\| \leq \|z\|^d$  et  $\|F_j(z)\| \leq \|z\|^d$  et
- la suite  $(F_j)$  converge vers  $F$  uniformément sur tout compact de  $\mathbb{C}^{k+1}$ .

On suppose de plus que

$$F_j(z_j) = z_j \quad \text{avec} \quad \mathbb{C}^{k+1} - \{0\} \ni z_j \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} z \in \mathbb{C}^{k+1} - \{0\}.$$

Comme dans la partie 1, on définit des suites décroissantes de fonctions  $\omega$ -psh  $(g^{(n)})_{n \geq 0}$  et  $(g_j^{(n)})_{n \geq 0}$  qui convergent simplement et dans  $L^1(\mathbb{P}^k)$  vers des fonctions  $\omega$ -psh  $g$  et  $g_j$ . Comme observé plus haut, on a alors

$$g_j(\pi(z_j)) = -\log \|z_j\|.$$

Venons-en au lemme clé.

LEMME 4.1. — *Si  $f$  n'est pas algébriquement stable, alors pour tout  $M \in \mathbb{R}$ , on a*

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} I_{\{g_j < -M\}}(g_j) = 1.$$

*Preuve.* — Fixons  $\varepsilon > 0$ . Soit  $n$  suffisamment grand pour que  $\deg(f^{(n)}) \leq \varepsilon \cdot d^n$ . Alors, comme nous l'avons vu dans la preuve de la proposition 2.1

$$I_{\{g^{(n)} = -\infty\}}(g) \geq 1 - \varepsilon.$$

En particulier pour tout  $M' \in \mathbb{R}$ ,

$$I_{\{g^{(n)} < -M'\}}(g) \geq 1 - \varepsilon.$$

Nous prétendons que la suite de courants  $\omega + \text{dd}^c g_j$  converge faiblement vers le courant  $\omega + \text{dd}^c g$ . En effet,  $g_j(\pi(z_j)) = -\log \|z_j\|$  et la suite  $(g_j)$  ne peut pas tendre uniformément vers  $-\infty$  sur  $\mathbb{P}^k$ . De plus

$$g_j \leq g_j^{(n)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} g^{(n)}.$$

Par conséquent, toute valeur d'adhérence  $h$  de la suite  $(g_j)$  dans  $L^1(\mathbb{P}^k)$  est majorée par  $g^{(n)}$  et comme cela est vrai pour tout  $n$ , on a  $h \leq g$ . D'après le lemme 3.2, on a donc  $\omega + \text{dd}^c h = \omega + \text{dd}^c g$ .

La convergence faible de  $\omega + dd^c g_j$  vers  $\omega + dd^c g$  implique alors que pour  $j$  suffisamment grand,

$$I_{\{g^{(n)} < -M'\}}(g_j) \geq I_{\{g^{(n)} < -M'\}}(g) - \varepsilon \geq 1 - 2\varepsilon.$$

Finalement, pour  $M' > M$ , si  $j$  est assez grand, alors

$$\{g^{(n)} < -M'\} \subseteq \{g_j^{(n)} < -M\} \subseteq_{g_j \leq g_j^{(n)}} \{g_j < -M\}.$$

Sinon, on pourrait trouver une suite de points  $x_j \in \mathbb{P}^k$  avec  $g^{(n)}(x_j) < -M'$  et  $g_j^{(n)}(x_j) \geq -M$ . Cela signifierait que l'on peut trouver des points  $z_j$  de norme 1 dans  $\mathbb{C}^{k+1}$  tels que  $\log \|F^{\circ n}(z_j)\| < -d^n M'$  et  $\log \|F_j^{\circ n}(z_j)\| \geq -d^n M$ . La suite  $F_j^{\circ n}$  convergeant uniformément vers  $F^{\circ n}$  sur la sphère unité, quitte à extraire une sous-suite de sorte que  $z_j$  tende vers  $z$ , on aurait  $-d^n M \leq \log \|F^{\circ n}(z)\| \leq -d^n M'$ , d'où une contradiction. Par conséquent, si  $j$  est suffisamment grand,

$$1 \geq I_{\{g_j < -M\}}(g_j) \geq I_{\{g_j^{(n)} < -M\}}(g_j) \geq I_{\{g^{(n)} < -M'\}}(g_j) \geq 1 - 2\varepsilon.$$

□

## 5. Existence de courants invariants pluripolaires

On se place maintenant dans le cadre du théorème. On note  $g_t$  la fonction de Green dynamique associée à  $f_t$ . Le lemme précédent implique donc que pour tout  $m \geq 1$ , l'ensemble

$$O_m = \{t \in [0, 1] ; I_{\{g_t < -m\}}(g_t) \geq 1 - 1/m\}$$

contient un ouvert dense de  $[0, 1]$  (il contient un voisinage de  $\mathcal{Z}$ ). L'intersection  $O_m$  est donc un ensemble gras au sens de Baire, de même que

$$A = \bigcap_{m \geq 0} O_m - \mathcal{Z}.$$

Soit  $t \in A$  et notons  $f = f_t$  et  $g = g_t$ . L'application  $f$  est algébriquement stable et par construction, pour tout  $m \geq 1$ ,

$$I_{\{g < -m\}}(g) \geq 1 - 1/m.$$

En passant à la limite quand  $m \rightarrow +\infty$  (convergence monotone), on voit que le courant  $T_f$  est pluripolaire :

$$\|T_f\|_{\{g=-\infty\}} = I_{\{g=-\infty\}}(g) \geq 1 = \|T_f\|.$$

**Remerciements.** — Je tiens à remercier mes collègues François Berteloot, Dan Coman, Jeffrey Diller, Romain Dujardin, Thomas Gauthier, Vincent Guedj, Frédéric Protin et Ahmed Zeriahi pour les échanges que nous avons eus et qui m'ont permis d'améliorer, voire de corriger des versions préliminaires de cette démonstration.

## Bibliographie

- [DDG] DILLER (J.), DUJARDIN (R.) & GUEDJ (V.). — Dynamics of meromorphic maps with small topological degree II: Energy and invariant measure à paraître à Comment. Math. Helvet.
- [DG] DILLER (J.) & GUEDJ (V.). — Regularity of dynamical Green functions, Transactions of the American Mathematical Society 9, p. 4783-4805 (2009).
- [F] FAVRE (C.). — Points périodiques d'applications birationnelles de  $\mathbb{P}^2$ , Annales de l'Institut Fourier, 48/4, p. 999-1023 (1998).
- [S] SIBONY (N.). — Dynamique des applications rationnelles de  $\mathbb{P}^k(\mathbb{C})$ , Panoramas et Synthèses, 8 p. 97-185 (1999).